

PIROUETTE™ - vækstreguleringsmiddel

Aktivt stof: Paclobutrazol 4 g/l
Fareklasse: Ingen
Emballage: 5 ltr dunk (4x5 ltr)
Opbevaring: Frostfrit

Pirouette er et vækstreguleringsmiddel, der anvendes til prydplanter og udplantningsplanter i væksthuse.

Pirouette udsprøjtes eller udvandes på planter i god vækst. Det optages gennem blade, stængel og rødder og giver planterne et mere kompakt udseende, mørkere blade og øget knopsætning og derved forøgelse af blomsterantallet.

Pirouette kan i de fleste tilfælde anvendes sammen med biologiske prædatorer. Spørg dog altid leverandøren af nyttedyrene før udsætning, så forenelighed sikres.

Væskemængder:

Sprøjt til begyndende afdrypning ca. 200 ml pr. m², ved fuldt plantedække. Planterne må ikke være våde, når der sprøjtes.

Ved udvanding bruges 50 ml væske pr. 10 cm potte.

Der skal gå 24 timer fra behandling med Pirouette, til der potvandes.

Tilberedning af sprøjtevæsken:

Pirouette omrystes grundigt inden brug.

Når vand og Pirouette blandes, fyldes sprøjtebeholderen halvt med vand, hvorefter det afmålte Pirouette tilsættes. Beholderen fyldes med vand under moderat omrøring..

Blandbarhed:

Pirouette er formuleret som en vandig opløsning, der indeholder de nødvendige sprede- klæbemidler.

Pirouette må ikke blandes med andre produkter.

Dosering:

Det er ikke muligt at fastsætte en præcis dosering for de enkelte arter fordi doseringen ikke kun afhænger af plantearten, men også af den anvendte sprøjteteknik, herunder væskemængde, antallet af sprøjtninger, sprøjteintervaller, planternes udviklingstrin ved 1. sprøjtning, og ikke mindst gartnerens krav til udseende af det produkt, han ønsker at fremstille. Ud fra de foreliggende oplysninger er det dog muligt at fastsætte et doseringsinterval, indenfor hvilke langt de fleste sprøjtninger udføres.

Dosering og behandlingstidspunkt:

Art	Dosering % styrke	Metode	Antal beh	Interval	Udvikling ved 1. beh.
Azalea	1,25-2,5	udsprøjtning	1 - 2	ca 14 dage	3-7 cm lange skud
Euphorbia	0,25-0,5	udsprøjtning	1 - 2	ca 7-10 dage	1-6 cm lang
Exacum affine	0,25-0,5	udvanding	1		2-8 cm høje planter
Kalanchoe	0,05 0,25-0,5	udvanding udsprøjtning	1 1		Synlig stor knop Synlig stor knop
Mimiaturre roser	1,25-2,5	udsprøjtning	2 - 3	ca 7-10 dage	1-4 cm lange skud
Pelargonium	0,125-0,25	udsprøjtning	1		2-3 uger efter potning

Udsprøjtning af Pirouette:

Pirouette bliver bl.a. optaget gennem bladene og virker bedst, når det udsprøjtes med meget fine dråber, som bliver siddende på bladene og tørrer langsomt. Der sprøjtes til begyndende afdrypning. Ved udvanding skal man sørge for en god og ensartet opblanding af væsken inden udvanding.

Opmærksomheden henledes på, at snitblomster ikke bør behandles hvis de skæres flere gange.

Jord og andre vækstmedier må ikke genanvendes til efterfølgende kulturer.

Efter sprøjtning med Pirouette skal planterne være tørre inden håndtering. De første 3 dage efter behandling bør der anvendes egnede handsker, f.eks. latex, ved håndtering af planterne.

Prøvesprøjtning:

Det anbefales at prøvesprøjte nogle enkelte planter, når der skiftes fra en sort til en anden, eller hvis kulturforholdene ændres inden hele partiet behandles.

Læs etiketten grundigt inden brug!



Taastrup Hovedgade 121, 2630 Taastrup
Tlf.: 4491 6055, Fax.: 4491 6575